

Hydrocortisone Roussel® 10 mg

Hydrocortisone

Viên nén

Vui lòng đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc

Giữ lại hướng dẫn sử dụng này vì bạn có thể cần đọc lại.

Nếu có thắc mắc hay nghi ngờ, xin hỏi thêm thông tin từ bác sĩ hoặc dược sĩ.

Thuốc được chỉ định riêng cho cá nhân. Không bao giờ được cho người khác, ngay cả những trường hợp có triệu chứng tương tự, vì nó có thể nguy hại cho họ.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Thuốc này chỉ bán theo đơn của bác sĩ.

NHẬN DẠNG THUỐC

Thành phần

Hydrocortisone 10mg

Tá dược: tinh bột bắp prégelatinisé, lactose monohydrate, stearat Mg, talc cho 1 viên nén.

Dạng bào chế và trình bày: Viên nén, hộp 25 viên.

Phân loại dược-điều trị

NỘI TIẾT TỐ GLUCOCORTICOID

NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÙNG THUỐC

Thuốc được chỉ định như điều trị thay thế trong những trường hợp suy thượng thận (giảm hoặc ngưng bài tiết các nội tiết tố do tuyến thượng thận tiết ra).

LUU Ý!

Những trường hợp không được sử dụng thuốc

TRONG TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ, CẦN PHẢI HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ

Lưu ý đặc biệt

Chế độ ăn: Bắt buộc phải tuân thủ chế độ ăn muối bình thường trong những trường hợp bị suy thượng thận.

Thận trọng khi sử dụng

Không bao giờ được ngưng thuốc đột ngột mà không có ý kiến y khoa.

Nhanh chóng thông báo cho bác sĩ mọi yếu tố thúc đẩy bất thường (sốt, nhiễm trùng, bệnh, can thiệp phẫu thuật, chấn thương) vì một số trường hợp có thể cần tăng liều hydrocortisone.

Vì có sự hiện diện của lactose, không sử dụng thuốc trong trường hợp galactose máu, hội chứng rối loạn hấp thu glucose và galactose hoặc thiếu lactase (bệnh chuyển hóa hiếm gặp).

TRONG TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ, ĐỪNG NGÀN NGẠI HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ

Tương tác thuốc và những tương tác khác

ĐỂ TRÁNH NHỮNG TƯƠNG TÁC CÓ THỂ XÂY RA GIỮA NHIỀU LOẠI THUỐC PHẢI BÁO CÁO CÓ HỆ THỐNG TẤT CẢ CÁC ĐIỀU TRỊ KHÁC

CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ.

Có thai – Cho con bú :Bác sĩ có thể quyết định, nếu cần thiết, chỉ định cho bạn điều trị này trong khi bạn có thai hoặc cho con bú.

NHÌN CHUNG, TRONG KHI CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ, NÊN LUÔN LUÔN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC

Thể thao: Lưu ý, thuốc có chứa hydrocortisone, thuốc có tên trong danh sách những chất kích thích.

Danh sách các tá dược cần biết để việc sử dụng không gây nguy hại cho một số bệnh nhân

Lactose

CÁCH SỬ DỤNG THUỐC NHƯ THẾ NÀO

Liều lượng

Liều và thời gian sử dụng thay đổi tùy theo nguyên nhân bệnh.

Trong mọi trường hợp tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ: tôn trọng liều chỉ định, giờ sử dụng và thời gian sử dụng.

Không bao giờ được ngưng điều trị mà không có ý kiến y khoa (xem thận trọng khi dùng).

Cách và đường sử dụng : Đường uống

Nuốt viên thuốc với 1 ly nước.

Ở trẻ em dưới 6 tuổi, có thể bẻ viên thuốc theo liều cần thiết, nghiền nát và trộn với thức ăn.

Tần suất và thời điểm dùng thuốc: Thuốc phải được dùng chung với bữa ăn

Thời gian điều trị: Tuân thủ chỉ định của bác sĩ

Trường hợp quá liều

Nguy cơ quá liều rất thấp trong những chỉ định của thuốc này. Trong trường hợp dùng quá 1 liều, tham vấn ngay bác sĩ.

Trong trường hợp quên một hay nhiều liều thuốc

Không bao giờ dùng nhiều liều cùng một lúc. Nếu gián đoạn điều trị, hãy tiếp xúc với bác sĩ điều trị.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

ĐÙNG NGÀN NGẠI HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ VÀ THÔNG BÁO TẤT CẢ CÁC TÁC DỤNG NGOẠI Ý HAY NHỮNG KHÓ CHỊU KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐÊN TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

BẢO QUẢN

KHÔNG ĐỀ QUÁ HẠN SỬ DỤNG GHI CHÚ NGOÀI BAO BÌ

Nhà sản xuất : Sanofi Winthrop Industrie - France

56, đường Choisy –au-Bac – 60205 Compiegne – Pháp

Doanh nghiệp nhập khẩu:

CN Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO (Tp.Hà Nội)

148 Hoàng Hoa Thám, P.12, Tân Bình.